

后天梅毒诊断报病简表（参考国标 WS273-2007）

可有或无 流行病学史	临床表现				实验室检查				诊断报病 (确诊病例)
	硬下疳 / 腹股沟淋巴结肿大	二期梅毒疹	树胶肿、骨、眼和心血管症状、神经症状等	无	RPR+ *	TPPA+ **	暗视野查螺旋体 +	脑脊液异常	
√	√				√	√			一期梅毒
√	√				√		√		
√	√					√	√		
√		√			√	√			二期梅毒
√		√			√		√		
√			√		√	√		有 / 无	三期梅毒
√				√	√	√			隐性梅毒

★ 特指非梅毒螺旋体抗原血清学试验，以 RPR 为例，还可包括 TRUST、USR、VDRL 等，一期梅毒该试验可为阴性。
★★ 特指梅毒螺旋体抗原血清学试验，以 TPPA 为例，还可包括 TPHA、TP-ELISA、TP-RT、FTA-ABS 等。
√：指符合该选项，本简表制作同时参考《梅毒、淋病、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南（2014）》。

胎传梅毒诊断报病简表

流行病学史：生母为梅毒患者或感染者	胎传梅毒临床症状	新生儿实验室检查					诊断报病
		RPR * 阴性或 RPR 阳性但滴度 < 母亲滴度 4 倍	RPR 阳性且滴度 ≥ 母亲滴度 4 倍	TPPA+ **	暗视野查螺旋体 +	梅毒螺旋体 IgM 抗体检测 +	
√	有 / 无				√		确诊病例
√	有 / 无					√	确诊病例
√	有 / 无		√	√			确诊病例
√	有 / 无	随访时由阴性转阳性或滴度上升		√			确诊病例
√	有 / 无	√		随访 18 个月 后仍持续阳性			确诊病例

★ 特指非梅毒螺旋体抗原血清学试验，以 RPR 为例，还可包括 TRUST、USR、VDRL 等；
★★ 特指梅毒螺旋体抗原血清学试验，以 TPPA 为例，还可包括 TPHA、TP-ELISA、TP-RT、FTA-ABS 等；
√：指符合该选项，本表参考《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2015 年版）》制订。
胎传梅毒疑似病例指所有未经有效治疗的患梅毒母亲所生的婴儿，或所发生的死胎、死产、流产病例，证据尚不足以确诊为胎传梅毒者，详见《梅毒、淋病、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南（2014）》。